



Informace k interpretaci FIB-4

Výpočet FIB-4 probíhá automaticky při zadání požadavků na ALT, AST a krevní obraz.

Je určen pro hodnocení pacientů v riziku chronického jaterního onemocnění (diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, dyslipidémie, obezita, chronické hepatitidy, ...)

V rutinní praxi by výpočet FIB-4 skóre měl být prvním krokem v detekci jaterní fibrózy.
Výpočet je nastaven pro pacienty starší 35 let.

Pokud je hodnota **FIB-4 nižší než 1,3**, je pravděpodobnost přítomnosti fibrózy nízká a je doporučeno pokračovat v dispenzarizaci pacienta. Test by měl být zopakován za 1-3 roky v závislosti na přítomnosti rizikových faktorů (diabetes mellitus, dyslipidémie, obezita apod.).

Pokud je hodnota **FIB-4 v pásmu 1,3 – 2,6**, je vhodné doplnit elastografii jater.

Pacienty s hodnotami **FIB-4 nad 2,6** a/nebo s již elastograficky prokázanými pokročilejšími formami jaterní fibrózy je potřeba poslat vždy ke specialistovi, optimálně hepatologovi/gastroenterologovi.

Biochemická laboratoř BILA s.r.o., Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh

Datum aktualizace: 23. 9. 2024